5-9

冯家山夕卡岩型铁铜矿床水化学异常特征及找矿标志*

蒋敬业 谭大芳 胡国俊 张丽春

(中国地质大学·武汉·430074)

p618.310.8

p618.440.8

冯家山夕卡岩型铁铜矿床水化学异常清晰,衬度高,最有效的找矿指标是 Ca^{2+} 和 SO_4^{2-} , 其次是 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 和 Ag^+ 。对于夕卡岩型矿床,pH值无异常,没有明显的指示意义。研究表明,亚热带气候条件下,由于温度高、雨量多,促进了硫化物的氧化而补偿了降雨的稀释作用。因此,水化学方法是十分有效的找矿方法,旱季和雨季不影响方法效果。

关键词 水化学找矿 夕卡岩型铁铜矿床 亚热带 鄂东南

铁矿床,找矿标志

1 研究区景观地球化学特征

冯家山矿床位于湖北大冶县城南约4km,属扬子北缘长江中下游铁铜成矿带西段鄂东南成矿区^[1]。该区为亚热带多雨湿润区,雨量足、气温高,年平均降雨约1500mm,4月~7月为雨季,11月至来年2月为旱季,最高月降雨量达400mm;7月平均温度最高,为29.3℃,1月最低亦在2℃以上。由于气温高,雨量多,风化作用强烈,岩浆岩体多呈负地形,沉积岩区多为浅丘低山。

岩石的含水特征是:灰岩裂隙、溶洞发育,为裂隙溶洞型含水岩石;灰岩与岩浆岩接触带常发育夕卡岩,夕卡岩致密、裂隙少,且多被方解石脉充填闭合,成为隔水层;石英闪长岩致密,只在表层风化裂隙带形成风化裂隙水,深度不大,5m~30m,因此亦为隔水层。以上3类岩石空间分布构成了地下水的水力联系(图1)。碳酸盐岩的裂隙岩溶水向山麓运移,遇夕卡岩或岩体阻隔,或溢出成泉,或由于沟谷切割以潜水渗出补给河流。由于夕卡岩带是矿化发育的有利部位,因此有利于应用水化学找矿。

2 矿床地质及地球化学特征

冯家山矿床位于阳新复式岩体北西仰起

端(图2),主岩体为花岗闪长岩,局部为石英闪长岩,属燕山早期产物,矿化则主要与石英闪长岩有关。二叠系、三叠系以灰岩为主的沉积岩构成冯家山倒转背斜主体,它是一被岩浆吞蚀未尽之半岛状大型残留体。

图1 冯家山矿床水力联系示意图

P—二叠系;T₁₋₄—下三叠统大理岩;1—大理岩;2—石英闪长岩;3—花岗斑岩;4—风化裂隙带;5—夕卡岩化带;6—矿体;7—潜水面及潜水流向;8—泉;9—溶洞、溶孔

矿化与早期岩浆活动有关,在灰岩与岩体接触带上常发育夕卡岩,已发现16处具有一定规模的夕卡岩带。矿化主要集中在冯家山东侧夕卡岩带中,根据矿化集中情况划分为I、II两个矿化带。I号矿化带是矿体主要集中段,矿化断续长800m,斜深56m~270m。II号矿带由数个小矿体组成。矿石主要金属矿物为磁铁矿、黄铜矿,其次为斑铜矿、黄铁矿、辉钼矿、赤铁矿等。矿区主要岩、矿石化学成分见表1,与鄂东南典型代表矿床铜录

本文1997年7月收到,王延忠编辑。
* 地质行业基金资助,编号:90024。

山铁铜矿床的地球化学特征一致^[2]。由表 1 可见,岩体具富铜贫铅特征,蚀变大理岩和蚀变石英闪长岩(包括内、外带夕卡岩)Cu、Ag、

Zn、Pb、Mo 明显增高,显示夕卡岩化过程与成矿关系密切。矿石化学成份以 Fe、Cu 为主,伴有少量 Ag、Mo、Zn、Pb 含量很低。

表 1 主要岩、矿石类型元素平均含量

岩石类型	样数	Cu	Fe	Mo	Pb	Zn	Ag	Mn
下三叠统灰岩	11	3.2		<3	<5	48	0.058	426
石英闪长岩	8	67		<3	11.4	63	0.081	670
斑状石英闪长岩	7	53		<3	9.5	46	0.068	528
蚀变大理岩	8	327		4.8	15.3	117	0.165	537
蚀变闪长岩	5	226		7.6	235	86	0.103	867
铜铁矿石	9	1.39%	27.67%	104	26.6	321	6.32	3300
铜矿石	7	1.07%	13.51%	131	37.2	98	14.76	1270
世界富钙花岗岩*	30			1.0	15	60	0.051	540
世界碳酸盐岩*	4			0.4	9	20		1100

* Turekian and Wedepohl(1961)

图 2 冯家山矿床及外围地质略图

T₁⁴—下三叠统下部大理岩、灰岩;T₁³—下三叠统上部大理岩、白云质大理岩;P₁¹—下二叠统上段灰岩;P₁²—下二叠统下段灰岩;C₂—中石炭统灰岩、白云岩;S₂—中志留统泥质粉砂岩;δ₀—石英闪长岩;δ₁—闪长斑岩;I—闪长岩;2—石英闪长岩;3—花岗闪长岩;4—夕卡岩;5—矿化带及编号;6—倒转背斜;7—地质界线

3 水化学工作方法与天然水中元素含量特征

在研究区 7km² 内采集井、泉及 1 级水系和部分 2 级水系的河水(图 3)。共在 29 处采

样,采重复样 6 件。

图 3 采样点位分布图

1—夕卡岩;2—矿化带;3—水点类型:泉、井、溪水;
4—样点位置及编号;5—分水岭;6—山峰

对每一采样点,现场测定水温、气温、水流量和 pH 值,记录采样点地质及水文地质特征。每一样点采水样二瓶:一瓶 500ml,用快速滤纸滤去悬浮物,用盐酸酸化至 pH = 2 左右,回驻地立即进行 PAN - CdS 共沉淀法处理,将沉淀物过滤带回室内作光谱近似定量分析 Cu、Pb、Zn、Ag 等 16 种微量元素;另一瓶取样 100ml,回驻地用比浊法测定 SO₄²⁻,滴定法测 HCO₃⁻ 和 CO₃²⁻。

对 Cu、Pb、Zn、Ag、As、Sb、Bi、Sn、Ni、Co、Cr、Be、Mo、Ga、Ti、V 等 16 种元素进行测试,其中 Cu、Zn、Pb、Mn、V、Ti 报出率达 100%,

Ag、Mo 分别为 84%、53%，其他元素仅个别样品可以检出，报出率小于 30%。故仅对 Cu、Pb、Zn、Ag、Mo、V、Ti 等元素和 SO_4^{2-} 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 进行了数据处理。扫视分析结果，并与实际地质背景对比，明显发现 Cu、Mo 和 SO_4^{2-}

离子含量在矿化区和背景区差别明显，泾渭分明。背景区 Cu 含量一般 $< 5\mu g/l$ ， $SO_4^{2-} < 10mg/l$ ，而矿化区 $Cu > 10\mu g/l$ ， $SO_4^{2-} > 20mg/l$ 。矿化区和背景区各种地球化学指标特征如表 2:

表 2 水中主要金属元素($\mu g/l$)和阴离子(mg/l)含量特征

		Cu	Pb	Zn	Ag	Mo	V	Ti	SO_4^{2-}	HCO_3^-	pH
背景区	$\bar{x}_0$	3.5	0.44	6.9	0.044	1.56	3.64	40.7	8.4	103.61	7.55
	R	1.0~6.6	<0.25~1.10	2.4~11.0	0.031~0.068	0.23~4.51	0.64~12.0	1.2~85.0	5~20	37.1~314.0	6.8~8.3
	S	1.7	0.29	3.2	0.016	1.37	1.58	37.3	4.7	87.2	0.41
矿化区	$\bar{x}_0$	31.3	0.54	15.7	0.016	13.25	6.03	44.73	104.4	113.06	7.76
	R	12.3~65.0	<0.25~1.30	5.6~32.0	0.027~0.096	0.73~50.0	1.2~34.5	5.3~139.0	16~160	62.6~256.9	6.7~8.3
	S	15.9	0.39	7.9	0.064	21.93	7.8	38.9	44.6	61.9	0.54
$\frac{\bar{x}_0}{\bar{x}_0}$	K	8.9	1.2	2.3	1.5	8.5	1.7	1.1	12.4	1.1	
	A										
A	$\bar{x}$	0.69	0.02	1.42		0.25			5.75		
	R	<0.11~2.33	<0.25~0.70	<0.29~2.52		0.06~1.52			3.5~8		
B	$\bar{x}$	0.65	0.40	17.2		1.02			7.52		
	R	<0.25~1.0	<0.25~0.80	5.6~29.7		0.2~1.4			2.4~13		

$\bar{x}$ —平均值; R—含量区间; S—均方差; 背景区样数为 15; 矿化区样数为 14; A 区样数为 13; B 区样数为 7

由表 2 可见，矿化区与背景区具最明显差别的是 Cu、Mo、 SO_4^{2-} 、Zn，其次是 Ag、Pb 在水中含量极低。这些特征与矿石组分特征(表 1)极为一致，表明水化学成分对矿石组份的响应极好。与第二松花江流域中低山花岗岩背景区裂隙水(A)^①和吉林六道沟 Cu—Mo 矿区背景水(B)相比^[3]，显示了铜含量高的典型特征，反映了长江中下游为“富铜省”

的区域地球化学特征。从研究区异常衬度值($\bar{x}_0/\bar{x}_0$)来看，以 SO_4^{2-} 、Cu、Mo 最高，达 8.5~12.4，其次是 Zn 为 2.4 倍，而 Ag、Pb、V 仅略高于背景，其他元素只能圈出个别点异常。因此，从异常衬度值看， SO_4^{2-} 、Cu、Mo 圈定的异常将会最清晰。

对主要成矿元素与其他组分关系进行 R 型相关分析(表 3)和 R 型聚类分析(图 4)。

表 3 成矿元素 Cu 与其他指标的相关系数表

	Pb	Zn	Ag	Mo	V	Ti	SO_4^{2-}	HCO_3^-	pH
矿化区 (n = 14)	0.161	0.460	0.441	0.500	0.468	0.439	0.417	-0.201	0.213
背景区 (n = 15)	-0.179	-0.181	0.293	0.433	0.103	-0.148	0.374	-0.290	-0.073

n = 15, $r_{0.05} = 0.514$; n = 14, $r_{0.05} = 0.532$

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3

图 4 R 型聚类分析谱系图

① 崔连生,等.第二松花江流域地下水环境背景值调查研究.国家“六五”科技攻关项目科研报告,1985

可见,成矿元素无论在背景区还是矿化区,与其他元素均不存在显著的相关联系。不过相对来说,Cu与Mo、 SO_4^{2-} 的相关系数大一些。从聚类谱系图看,Cu、Mo、 SO_4^{2-} 在矿化区紧密相聚为一簇,而Pb、V、Zn、Ag及Ti为一簇, HCO_3^- 和pH为一簇,显示最有找矿意义的是Cu、Mo和 SO_4^{2-} 3个指标。另外,矿化区的元素组合与背景区(石英闪长岩)的元素组合(三簇)基本对应,反映成矿作用与岩浆活动密切联系。

4 水化学异常特征

前述分析表明,水化学异常显示最清晰的是Cu、Mo、 SO_4^{2-} ,其次是Ag、Zn。对上述指标按背景值加二倍均方差作异常下限,并按异常下限的1、2、4倍划分外、中、内三级浓度分带,绘制了研究区水化学异常图(图5)。

总起来看,雨旱两季对水化学指标含量影响并不严重,更何况亚热带早、雨两季雨量不如北方干旱区差异大,且高温多雨的夏季更有利于化学风化,削弱了降雨的影响。因

此,北方干旱区旱季成矿元素浓度高,有利于找矿,而在亚热带多雨区,则无论旱季、雨季,主要地球化学指标异常强度高,清晰可辨,水化学方法找矿不受影响。

表4 主要异常点雨旱两季异常强度对比表

点号	水样意义	流量(L/s)		Cu($\mu\text{g/l}$)		SO ₄ ²⁻ (mg/l)	
		91.10.8 (旱季)	92.6.11 (雨季)	91.10.8 (旱季)	92.6.11 (雨季)	91.10.8 (旱季)	92.6.11 (雨季)
10	切过II号矿带沟水	0.185	1.10	43	60	160	115
13	II号矿带东侧泉水			40	87	75	45
14	I号矿带南端泉水			65	272	75	65
15	I号矿带南端冲沟	0.04	0.11	30	77	135	115
17	I号矿带东侧民井			25	42	160	80
22	I号矿带北侧沟水	0.19	0.55	59	36	155	175
平均异常衬度				12.5	17.2	15.1	11.8

5 结论

本研究虽是在已知矿床上的试验,但对我国南方亚热带地区寻找内生铜矿床仍具有普遍意义:

1)夕卡岩型铜矿床的最有效的找矿指标是 Cu、SO₄²⁻,其次是 Mo、Zn 和 Ag, pH 值的指示意义不佳。

2)水化学找矿方法在亚热带多雨湿热区是有效可行的,采样季节基本不影响找矿的

效果。

参考文献

- 1 常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铁铜成矿带.北京:地质出版社,1992
- 2 周亚特.铜录山铜矿床地球化学特征及外围成矿预测.见:勘查地球物理勘查地球化学文集(第二集).北京:地质出版社,1985
- 3 Jiang Ruijin, Ren Tianxiang, Zhang Hua, et al. Orientation hydrogeochemical survey of the Liudagou Cu - Mo mineralized zone in a basalt-covered area northern tectonic chain. Journal of Geochemical Exploration. 1994(51), 1
- 4 阮天健,朱有光.地球化学找矿.北京:地质出版社,1984

CHARACTERISTICS OF HYDROCHEMICAL ANOMALIES AND PROSPECTING CRITERIA OF THE FENGJIASHAN SKARN Fe - Cu DEPOSIT

Jiang Jingye, Tan Dafang, Hu Guojun, Zhang Lichun

The hydrochemical anomalies of the Fengjiashan skarn Fe - Cu deposit are characterized by high contrast. Cu²⁺ and SO₄²⁻ are the most effective indicators for geochemical prospecting, while Mo⁴⁺, Zn²⁺ and Ag⁺ take the second place. pH shows no anomaly and has no significant meaning for skarn deposit. The research indicates that under the condition of subtropic region, owing to the abundant rainfall and the high temperature, the promoted oxidation of sulfides can compensate the dilution by rain. The hydrochemical prospecting serves as an effective prospecting method which may not be affected by dry or rainy season.

Key words hydrochemical prospecting, skarn Fe - Cu deposit, subtropic region, southeast Hubei

第一作者简介:

蒋敬业 男,1943年生。1967年毕业于北京地质学院勘探系,1982年获地球化学硕士学位。现任中国地质大学(武汉)地球科学学院副教授,主要从事地球化学研究和教学工作,专长为地球化学勘查、金矿化探及水化学勘探。

通讯地址:湖北省武汉市关山街鲁磨路31号 中国地质大学(武汉)地球化学研究所
邮政编码:430074